

## مقاله علمی:

## مطالعه جمعیت‌های ماهی خیاطه (*Alburnoides eichwaldii*) با استفاده از صفات ریختی در رودخانه‌های استان گلستان

حسن صحرایی<sup>۱\*</sup>، احمدرضا پیرعلی زفره ئی<sup>۲</sup>، صدیق عزیزی<sup>۲</sup>، پریا هوشمند<sup>۲</sup>، سید علی اکبرهدایتی<sup>۲</sup>

\*Email: hasansahraei22@gmail.com

- ۱- گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
- ۲- گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
- ۳- گروه زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران.

تاریخ پذیرش: خرداد ۱۴۰۰

تاریخ دریافت: بهمن ۱۳۹۹

## چکیده

این مطالعه با هدف بررسی امکان جداسازی ذخایر جمعیت‌های ماهی خیاطه (*Alburnoides eichwaldii*) با استفاده از صفات ریخت‌سنجی در رودخانه‌های استان گلستان، بین سه منطقه زرین گل، مبارک آباد و دشت در بهار ۱۳۹۵ صورت پذیرفت. بدین منظور، ابتدا تعداد ۴۵ نمونه ماهی خیاطه صید شد، سپس صفات ریختی با استفاده از کولیس با دقت ۰/۰۱ میلی‌متر اندازه‌گیری شد. در صفات ریختی از روش تجزیه به مولفه‌های اصلی جدا بودن دو ذخیره مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش حاضر نشان داد که نمونه‌ها در سه منطقه مورد مطالعه از هم جدا شده‌اند که می‌تواند به علت تغییراتی همچون شرایط زیستگاهی و جنس بستر باشد. به طور کلی، انجام مطالعات مشابه جهت مدیریت منطقی و کارآمد شیلاتی و حفاظت از منابع زیستی و ذخایر ژنتیکی، شناسایی ساختار ذخیره‌ای گونه‌ای از ماهیان بومی هر منطقه توصیه می‌گردد.

**کلمات کلیدی:** تفکیک جمعیت، ریخت‌شناسی، مبارک آباد، زرین گل، زیستگاه

## مقدمه

بررسی ماهیان در اکوسیستم‌های آبی از لحاظ تکاملی، بوم‌شناسی، رفتارشناسی، حفاظت، مدیریت منابع آبی، بهره‌برداری ذخایر و پرورش ماهی حائز اهمیت است (Lagler et al., 1977). مطالعه انعطاف‌پذیری ویژگی‌های ریخت‌شناختی جمعیت‌های یک گونه که در محیط‌های متفاوت از نظر خصوصیات زیستگاهی زندگی می‌کنند، امکان درک بهتر تغییرات ویژگی‌های جمعیتی را در مقابل تغییرات محیطی فراهم می‌کند. انعطاف‌پذیری ریختی جمعیت‌های یک گونه در محیط‌های متنوع، پدیده‌ای است که در نتیجه اثر فاکتورهای محیطی بر اجداد جمعیت‌های یک گونه در راستای پدیده گونه‌زایی حاصل می‌شود (Adams and Collyer, 2009). مطالعه ماهیان در اکوسیستم‌های آبی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در آبهای داخلی ایران حدود ۱۶۰ گونه ماهی وجود دارد که عمدتاً متعلق به سه خانواده *Cobitidae*، *Balitoridae* و *Cyprinidae* هستند. بیشتر این ماهی‌ها دارای ارزش صید اقتصادی، صید ورزشی، زیبایی‌شناسی و مبارزه‌زیستی هستند (حقیقی و همکاران، ۱۳۹۳). ماهی خیاطه (*Alburnoides eichwaldii*) از خانواده کپورماهیان، دارای بدنی کوچک است که عمدتاً مناطق کم‌عمق، پراکسیژن و بسترهای سنگلاخی نهرهای کوهستانی را برای زیست ترجیح می‌دهد و به سبب تحمل پایین در برابر آلودگی‌ها به منزله اندیکاتور زیستی مناسب در ارزیابی کیفی محیط محسوب می‌شود (عباسی و همکاران، ۱۳۹۲). اهمیت ماهی خیاطه در شیلات معمولاً به عنوان طعمه برای صید و از لحاظ تفریحی نگهداری در آکواریوم می‌باشد. اندازه آن کوچک است. لذا، ارزش صید ورزشی و اقتصادی ندارد اما با توجه به رنگ‌های زیبای روی بدن (رنگ باله شکمی و مخرجی متمایل به قرمز و یک نوار تیره در دو طرف خط جانبی) دارای ارزش زیبایی‌شناسی می‌باشد (Abdoli, 2000). یک حوضه آبریز ممکن است دارای چندین جمعیت از یک گونه باشد. مطالعه ویژگی‌های ریخت‌شناسی، ریخت‌سنجی و شمارشی با هدف تعریف و شناسایی واحدهای جمعیتی از پیشینه طولانی در دانش زیست‌شناسی ماهی برخوردار است (Paknejad et al., 2014). بنابراین، با مطالعه صفات قابل اندازه‌گیری هر یک از ماهیان و به‌کارگیری روش‌های آماری می‌توان تعدادی از صفات

مورفولوژیک شاخص یک جمعیت را به‌دست آورد (Wooton, 1991). از آنجایی‌که ماهی خیاطه به تغییرات ساختاری رودخانه‌ها بسیار حساس است (Breitenstein and Kirchhofer, 2000)، این مطالعه با هدف بررسی امکان جداسازی ذخایر مطالعه جمعیت‌های ماهی خیاطه (*Alburnoides eichwaldii*) با استفاده از صفات ریخت‌سنجی در رودخانه‌های استان گلستان، بین سه منطقه زرین‌گل، مبارک‌آباد و دشت صورت پذیرفت.

## مواد و روش‌ها

به منظور بررسی صفات ریخت‌سنجی در رودخانه‌های استان گلستان، بین سه منطقه زرین‌گل، مبارک‌آباد و دشت، تعداد ۴۵ نمونه در بهار ۱۳۹۵ صید گردید. صفات ریختی با استفاده از کولیس با دقت ۰/۰۱ میلی‌متر اندازه‌گیری شد. صفات ریخت‌سنجی قبل از تجزیه و تحلیل به جهت کاهش خطای حاصل از رشد آلومتریکی استاندارد شدند (فرمول ۱)، (Beacham, 1985).

$$M(t) = M(0)(L/L_0)^b \quad \text{فرمول ۱:}$$

$M(t)$  = مقادیر استاندارد شده صفات؛  $M(0)$  = طول صفات مشاهده شده؛  $L$  = میانگین طول استاندارد برای کل نمونه و برای همه مناطق؛  $L_0$  = طول استاندارد هر نمونه؛  $b$  = ضریب رگرسیونی بین  $\log M_0$  (لگاریتم صفت مشاهده شده) و  $\log L_0$  برای هر منطقه

کارایی داده‌های اصلاح شده از طریق آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر اصلاح شده و طول استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. معنی‌دار نبودن این همبستگی نشان‌دهنده حذف کامل اثر اختلاف اندازه داده‌ها می‌باشد (Turan et al., 2006). برای انجام محاسبات مذکور از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ و Excel و نرم افزار PAST استفاده گردید. برای تمام صفات مورد مطالعه شاخص‌های آماری میانگین و انحراف برآورد گردید.

برای مقایسه معنی‌داری صفات ریخت‌سنجی اندازه‌گیری شده بین سه منطقه زرین‌گل، مبارک‌آباد و دشت در مواردی که صفات نرمال بود از آزمون t-test مستقل و در مواردی که داده‌ها نرمال نبودند به  $\log(x+0.5)$  منتقل شدند صفاتی که بعد از انتقال

در جداول ۱، ۲ و ۳ ارائه شده است. با استفاده از روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی از ترکیب خطی ۲۶ صفت ریخت‌سنجی مطلق، مؤلفه‌هایی بدست آمد که ویژگی خاصی از صفات را نشان می‌دهد و هر چه میزان واریانس یک مؤلفه بیش‌تر باشد، ضریب شرکت آن مؤلفه در تفکیک جمعیت‌ها بیش‌تر خواهد بود. نتایج به‌دست آمده ماهی خیاطه در رابطه با صفات ریخت‌سنجی نسبی در ذخایر ماهی خیاطه در سه منطقه نشان می‌دهد که تقریباً تمام نمونه‌های سه ذخیره از یک‌دیگر تفکیک شده و هم‌پوشانی بسیار جزئی با یک‌دیگر دیده می‌شود ولی نمونه‌های مبارک‌آباد هم‌پوشانی کم‌تری نسبت به دو منطقه زرینگل و دشت داشت و اگرچه در برخی موارد هم‌پوشانی میان برخی نمونه‌ها با یک‌دیگر دیده می‌شود.

نیز نرمال نبودند، برای مقایسه معنی‌داری بین آنها از آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی استفاده شد. برای آزمون نرمال بودن صفات از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. برای مقایسه توزیع فراوانی طولی بین دو جنس نر و ماده از آزمون کولموگراف اسمیرنوف دو نمونه‌ای استفاده شد. برای مقایسه میانگین طولی بین مناطق از روش مبتنی بر رایانه Randomization test استفاده شد. برای انجام این روش از ماکرونویسی در اکسل با زبان VBA استفاده شد.

## نتایج

میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر صفات ریخت‌سنجی مطلق گونه ماهی خیاطه زرینگل، مبارک‌آباد و دشت به ترتیب

جدول ۱: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر صفات ریخت‌سنجی مطلق گونه ماهی خیاطه در زرینگل

منطقه مورد مطالعه			صفت مورد مطالعه
زرینگل			
p	حداکثر - حداقل	انحراف معیار ± میانگین	
۰/۰۵۲	۷/۰۷ - ۱۱/۴۴	۸/۶۲۳ ± ۱/۳۳	طول سر
۰/۰۲۳	۸/۶۹ - ۲۰/۷۴	۱۲/۸۷ ± ۳/۰۸	عمق بدن
۰/۰	۵/۳ - ۲۰/۶۵	۱۱/۷۷۴ ± ۳/۷۷	ماکزیمم پهناى بدن
۰/۲۱۸	۲/۹۳ - ۱۵/۰۶	۷/۳ ± ۳/۸۴	قاعده باله پشتی
۰/۰۰۲	۳/۲۸ - ۸/۸۳	۶/۷ ± ۱/۷۸	ارتفاع باله پشتی
۰/۵۲۴	۳/۵۲ - ۱۰/۵۹	۵/۳۸ ± ۱/۶۵	قاعده باله مخرجی
۰/۰۴۱	۲/۱۸ - ۹/۳۱	۴/۹۳ ± ۲/۱۵	ارتفاع باله مخرجی
۰/۰۵۶	۴/۹۵ - ۱۳/۳۲	۷/۳۹ ± ۲/۲۵	طول باله سینه‌ای
۰/۱	۲/۸۲ - ۱۱/۶	۶/۱۱ ± ۲/۲۲	طول باله شکمی
۰/۰۶۴	۱۶/۳۸ - ۴۰/۳۱	۲۳/۴۹ ± ۵/۹۲	طول پیش باله پشتی
۰/۰۲۶	۷/۱۶ - ۱۷/۴۸	۱۱/۴۵ ± ۲/۹۷	فاصله پشتی شکمی
۰/۰۰۲	۵/۶ - ۱۲/۵۴	۸/۱۱ ± ۲/۰۱	فاصله سینه‌ای شکمی
۰/۰۰۲	۳/۵۳ - ۱۱/۱	۶/۲۱۱ ± ۲/۰۴	فاصله شکمی مخرجی
۰/۰۰۱	۴/۳۸ - ۱۴/۳	۷/۸۶ ± ۲/۲۶	طول ساقه دمى
۰/۱۴۵	۳/۰۴ - ۷/۷۲	۴/۸۲ ± ۱/۴۳	ارتفاع ساقه دمى
۰/۰۵۶	۲/۶۸ - ۷/۶۲	۴/۵۳ ± ۱/۲۳	عرض ساقه دمى
۰/۰۲۱	۴/۶۳ - ۱۰/۲۹	۶/۷۴ ± ۱/۳۸	طول لوب بالایى باله دمى
۰/۰۱	۳/۵۱ - ۱۶/۵۵	۷/۶۸ ± ۳/۳۸	طول لوب پایینیى باله دمى
۰/۰۴۹	۶/۵۷ - ۱۳/۵۸	۸/۲۷ ± ۱/۸	ارتفاع سر
۰/۰۰۲	۳/۶۶ - ۱۳/۸۲	۸/۲۲ ± ۲/۲۹	پهنای سر
۰/۰۱۳	۲/۷۳ - ۵/۸	۳/۶۸ ± ۰/۸۹	فاصله چشمی
۰/۰۰۲	۱/۵۶ - ۲/۹۴	۱/۹۹ ± ۰/۴۱	فاصله بین سوراخ بینی

منطقه مورد مطالعه			صفت مورد مطالعه
زرینگل			
p	حداکثر - حداقل	انحراف معیار ± میانگین	
۰/۱۷۴	۲/۱۹ - ۳/۷۴	۲/۷۲ ± ۰/۴۳	قطر چشم
۰/۲۴	۰/۷۷ - ۳/۰۵	۱/۲۵۶ ± ۰/۵۴۷	قطر مردمک
۰/۰۳۴	۲ - ۴/۶۴	۲/۹۶ ± ۰/۶۹	فاصله پیش چشمی
۰/۳۶۶	۴/۰۸ - ۸/۶۹	۵/۶۷ ± ۱/۲	فاصله پشت چشمی

جدول ۲: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر صفات ریخت‌سنجی مطلق گونه ماهی خیاطه در مبارک‌آباد

منطقه مورد مطالعه			صفت مورد مطالعه
مبارک‌آباد			
p	حداکثر - حداقل	انحراف معیار ± میانگین	
۰/۰۵۲	۵/۷۴ - ۱۲/۹۴	۸/۹۰ ± ۲/۲۵	طول سر
۰/۰۲۳	۷/۱۸ - ۱۷/۹۴	۱۱/۴۳ ± ۳/۴	عمق بدن
۰/۰	۲/۸۱ - ۹/۳۶	۶/۳۲ ± ۱/۸	ماکزیمم پهناى بدن
۰/۲۱۸	۴/۰۲ - ۱۲	۷/۱۵ ± ۲/۰۱	قاعده باله پشتی
۰/۰۰۲	۲/۳۸ - ۸/۴۶	۴/۸۵ ± ۱/۹۱	ارتفاع باله پشتی
۰/۵۲۴	۲/۶۹ - ۱۰/۳۱	۵/۷۳ ± ۲/۱۴	قاعده باله مخرجی
۰/۰۴۱	۰/۹۸ - ۵/۳۸	۳/۲۸ ± ۱/۲۴	ارتفاع باله مخرجی
۰/۰۵۶	۵/۷۵ - ۱۱/۹۱	۷/۴۷ ± ۱/۷۴	طول باله سینه‌ای
۰/۱	۳/۹۹ - ۹/۲۱	۵/۸۹ ± ۱/۴۳	طول باله شکمی
۰/۰۶۴	۶/۲۸ - ۳۵/۱۴	۱۸/۱۷۳ ± ۸/۶۳	طول پیش باله پشتی
۰/۰۲۶	۴/۸۱ - ۱۴/۸۴	۹/۵۷ ± ۲/۶	فاصله پشتی شکمی
۰/۰۰۲	۴/۶۳ - ۱۶/۸۹	۱۰/۰۵۶ ± ۳/۲۴	فاصله سینه‌ای شکمی
۰/۰۲	۴/۱۸ - ۱۴/۰۴	۷/۱۳ ± ۲/۷۹	فاصله شکمی مخرجی
۰/۰۰۱	۳/۲۴ - ۹/۶۹	۵/۷۶ ± ۱/۸۹	طول ساقه دمى
۰/۱۴۵	۳/۰۹ - ۹/۲۷	۵/۱۶ ± ۱/۹۹	ارتفاع ساقه دمى
۰/۰۵۶	۰/۴۳ - ۶/۹	۴/۰۵ ± ۱/۷۱	عرض ساقه دمى
۰/۰۲۱	۴/۱۳ - ۱۳/۳	۸/۱۵ ± ۲/۵۹	طول لوب بالایى باله دمى
۰/۰۱	۵/۱۳ - ۱۵/۱۸	۸/۹۴ ± ۲/۶۵	طول لوب پایینی باله دمى
۰/۰۴۹	۴/۸۲ - ۱۰/۳۵	۷/۸۳ ± ۱/۵۳	ارتفاع سر
۰/۰۲	۳/۲۷ - ۹/۶۸	۶/۳۲ ± ۱/۹۲	پهناى سر
۰/۰۱۳	۲/۲۱ - ۶/۳۴	۳/۸۲ ± ۱/۲۹	فاصله چشمی
۰/۰۰۲	۱/۵۶ - ۴/۲۹	۲/۵ ± ۰/۸۱	فاصله بین سوراخ بینی
۰/۱۷۴	۲/۰۲ - ۳/۸۹	۲/۵۷ ± ۰/۵۲۵	قطر چشم
۰/۲۴	۰/۵۱ - ۱/۷	۱۰/۰۲ ± ۰/۲۹	قطر مردمک
۰/۰۳۴	۱/۷۸ - ۴/۷۴	۳/۲ ± ۰/۸۷	فاصله پیش چشمی
۰/۳۶۶	۳/۶۷ - ۸/۸۶	۵/۲۳ ± ۱/۵۴	فاصله پشت چشمی

جدول ۳: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر صفات ریخت‌سنجی مطلق گونه ماهی خیاطه در دشت

منطقه مورد مطالعه			صفت مورد مطالعه
دشت			
p	حداکثر-حداقل	انحراف معیار $\pm$ میانگین	
۰/۰۵۲	۵/۸۶-۱۰/۳۷	۷/۴۹ $\pm$ ۱/۰۳	طول سر
۰/۰۲۳	۸/۳۶-۱۵/۱۹	۹/۹۲ $\pm$ ۱/۶۷	عمق بدن
۰/۰	۶/۵۹-۱۵/۳۷	۹/۲۵ $\pm$ ۱/۹۶	ماکزیمم پهناى بدن
۰/۳۱۸	۷/۶۱-۱۱/۹۱	۸/۶۷ $\pm$ ۱/۰۶	قاعده باله پشتی
۰/۰۰۲	۳/۹۲-۶/۵۵	۴/۶۹ $\pm$ ۰/۸۱	ارتفاع باله پشتی
۰/۵۲۴	۳/۷۳-۶/۶۷	۵/۰۴ $\pm$ ۰/۰۹	قاعده باله مخرجی
۰/۰۴۱	۲/۰۸-۹/۵۱	۴/۴ $\pm$ ۱/۷۳	ارتفاع باله مخرجی
۰/۰۵۶	۳/۹۳-۱۱/۰۱	۵/۹۴ $\pm$ ۱/۶۴	طول باله سینه ای
۰/۱	۳/۲۴-۹/۰۲	۴/۸۳ $\pm$ ۱/۳۶	طول باله شکمی
۰/۰۶۴	۱۵/۶۵-۲۷/۱۲	۱۹/۴۸ $\pm$ ۲/۸	طول پیش باله پشتی
۰/۰۲۶	۷/۳۶-۱۳/۹۶	۹/۰۵ $\pm$ ۱/۵۷	فاصله پشتی شکمی
۰/۰۰۲	۵/۰۲-۹/۳۴	۶/۸۴ $\pm$ ۱/۳۴	فاصله سینه ای شکمی
۰/۰۲	۳/۳۷-۶/۵۸	۴/۹۱ $\pm$ ۱/۰۱	فاصله شکمی مخرجی
۰/۰۰۱	۶/۵۵-۱۲/۱۵	۸/۵۵ $\pm$ ۱/۸۴	طول ساقه دمى
۰/۱۴۵	۳/۴۱-۶/۲۱	۴/۰۹ $\pm$ ۰/۷۲	ارتفاع ساقه دمى
۰/۰۵۶	۲/۳۷-۵/۹۸	۳/۳۵ $\pm$ ۰/۸۲	عرض ساقه دمى
۰/۰۲۱	۳/۷-۸/۹۷	۶/۲۵ $\pm$ ۱/۲۹	طول لوب بالایی باله دمى
۰/۰۱	۲/۳۶-۱۰/۴۷	۵/۸ $\pm$ ۱/۸۱	طول لوب پایینی باله دمى
۰/۰۴۹	۵/۲۶-۱۰	۶/۸۹ $\pm$ ۱/۱۳	ارتفاع سر
۰/۰۲	۵/۱-۱۰/۱۲	۶/۸۵ $\pm$ ۱/۱	پهناى سر
۰/۰۱۳	۲/۱۹-۴/۲۹	۲/۸۱ $\pm$ ۰/۵۱۳	فاصله چشمی
۰/۰۰۲	۱/۱۵-۳/۰۳	۱/۷ $\pm$ ۰/۴۲	فاصله بین سوراخ بینی
۰/۱۷۴	۱/۸۷-۲/۸۵	۲/۴۳ $\pm$ ۰/۲۴	قطر چشم
۰/۲۴	۰/۸۵-۱/۸۸	۱/۰۷ $\pm$ ۰/۲۵	قطر مردمک
۰/۰۳۴	۱/۹۸-۳/۹۵	۲/۵۱ $\pm$ ۰/۴۶	فاصله پیش چشمی
۰/۳۶۶	۳/۶۷-۸/۸۶	۵/۰۸ $\pm$ ۱/۱۷	فاصله پشت چشمی

## بحث

به طور کلی، مطالعه ویژگی‌های ریخت‌شناسی، با هدف تعریف و شناسایی واحدهای جمعیتی، از پیشینه‌ای طولانی در دانش زیست‌شناسی ماهی برخوردار است (Tudela, 1999) و به منظور مدیریت منطقی و کارآمد شیلاتی و همین‌طور حفاظت از منابع زیستی و ذخایر ژنتیکی، شناسایی ساختار ذخیره‌ای گونه‌ای از ماهیان بومی هر منطقه، اهمیت به‌سزایی دارد (Turan et al., 2006; Tzeng, 2004). در بیش‌تر مطالعات ریخت‌سنجی فاکتور اندازه بدن ممکن است به میزان ۸۰ درصد یا بیش‌تر در وجود تغییرات بین متغیرهای اندازه‌گیری شده تأثیر گذار باشد (Tzeng, 2004). از آنجایی‌که آزمون واریانس یک طرفه درباره ویژگی‌های ریخت‌سنجی اصلاح شده صورت پذیرفت، هر گونه اختلاف معنی‌داری نشان‌دهنده اختلاف در شکل بدن نه در اندازه آنها می‌باشد. زمان صید و نمونه‌برداری نیز چندان نمی‌تواند بر متغیرهای مورد اندازه‌گیری، اثرات بزرگ ایجاد نماید (Mamturis et al., 1998). ماهی خیاطه قسمت‌های میانی و فوقانی رودخانه‌ها را ترجیح می‌دهد که غنی از اکسیژن، دارای بستر قلوه‌سنگی و سنگلاخی و دمای ۲۰-۵ درجه سانتی‌گراد است (عبدلی، ۱۳۷۸). دما هم یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده توزیع مکانی ماهیان نه‌ری است (Brazner et al., 2005; Heino, 2002). ماهی خیاطه عمدتاً در مناطق کم‌عمق و جریان دار نه‌ری‌های کوهستانی ساکن شده است. این ماهیان بسترهای سنگی سخت و اکسیژن بالا و آبهای تمیز را ترجیح می‌دهند.

نتایج به‌دست آمده ماهی خیاطه در رابطه با صفات ریخت‌سنجی نسبی در ذخایر ماهی خیاطه در سه منطقه نشان می‌دهد که تقریباً تمام نمونه‌های سه ذخیره از یک‌دیگر تفکیک شده و هم‌پوشانی بسیار جزیی با یک‌دیگر دیده می‌شود، ولی نمونه‌های مبارک‌آباد هم‌پوشانی کم‌تری نسبت به دو منطقه زرينگل و دشت داشت و اگرچه در برخی موارد هم‌پوشانی میان برخی نمونه‌ها با یک‌دیگر دیده می‌شود که این می‌تواند بستگی به بستر متفاوت رودخانه‌های مورد مطالعه باشد. ویژگی‌های محیطی طی دوران اولیه تکامل ماهی غالب بوده است و افراد نسبت به شرایط محیطی حساسیت بیش‌تری دارند. معمولاً ماهیانی که در دوران اولیه زندگی دارای شرایط محیطی مشابهی هستند، از لحاظ ریختی وضعیت مشابهی دارند

(Pinheiro et al., 2005). از سوی دیگر، هنگامی که ماهی در اوضاع محیطی جدیدی قرار گیرد، این امکان وجود دارد که تغییرات ریخت‌شناسی به‌سرعت در آن رخ دهد (Poulet et al., 2004).

در راستای نتایج این تحقیق، مطالعات ماهی‌شناسان بر ماهیان دریای خزر نشانگر این واقعیت است که بسیاری از ماهیان روند گونه‌زایی را طی نموده و روند تدریجی ایجاد جمعیت‌ها ادامه دارد به‌طوری‌که گونه‌های خزری زیرگونه‌ها و جمعیت‌هایی را در مناطق مختلف دریای خزر تشکیل داده است که این می‌تواند دلیل معقولی برای تمایز براساس صفات ریخت‌شناسی ماهیان در یک منطقه‌ای باشد. همچنین در بررسی صفات ریخت‌شناسی مشاهده شده است که عرض سر و ارتفاع بدن در نمونه‌های دشت و مبارک‌آباد کوچک‌تر از نمونه‌های زرينگل می‌باشد به‌طوری‌که پیش‌تر برخی از محققان پیشنهاد کرده‌اند که اختلاف در ریخت سر ماهیان و شکل بدن آنها می‌تواند بیان‌کننده گروه‌های مختلف تروفی باشد (Tudela, 1999) همچنین در برخی مطالعات ثابت شده است که اختلاف ریخت‌سنجی در صفات سر می‌تواند به دلیل وجود زیستگاه‌های مختلف باشد. اندازه سر و موقعیت چشم با وضعیت عمودی زیستگاه و نوع تغذیه در ارتباط است (Aleev, 1969). به طور عمده، تغییر شکل در ناحیه سر و دهان نیز می‌تواند منعکس‌کننده تفاوت در تغذیه شامل نوع و جهت تغذیه و ترکیب غذایی مورد استفاده است (Langerhans et al., 2003). این موضوع به‌ویژه در مورد نیچ‌های اکولوژیک مختلف همراه با رژیم‌های غذایی مختلف که در معرض تخریب هستند، اهمیت دارد. برای مثال، می‌توان گفت ریخت سر ماهیان می‌تواند بر اساس استراتژی تغذیه آنها، نوع و اندازه غذای خورده شده تحت تغییر قرار گیرد. ساقه‌دمی عریض‌تر می‌تواند قابلیت شنا را در ماهیان (Fisher and Hogan, 2007) به‌واسطه تسریع شروع حرکت، افزایش دهد (Webb, 1982). عرض ساقه‌دمی در ماهیان هر سه منطقه مورد مطالعه دارای تفاوت می‌باشد. این ویژگی برای کسب غذا با توجه به زیستگاه ماهی اهمیت زیادی دارد. زیستگاه، درجه حرارت و نوع جریان آب به عنوان عوامل تعیین‌کننده شکل بدن در ماهی خیاطه گزارش شده است (Dadikyan, 1972) بنابراین، افزون بر تفاوت در

## منابع

- حقیقی، ا.، ستاری، م.، درافشان، س. و کیوانی، ی.، ۱۳۹۳. ساختار ژنتیکی ماهی خیاطه (*Alburnoides eichwaldii*) رودخانه‌های کرگان‌رود و چالوس، تاکسونومی و بیوسستماتیک ۶(۱۹): ۱-۱۴.
- عباسی، ف.، قربانی، ر.، یلقی، س.، حاجی مرادلو، ع. و فاضل، ع.، ۱۳۹۲. مطالعه برخی خصوصیات زیستی ماهی خیاطه (*Alburnoides eichwaldii*) در نهر تیل آباد، استان گلستان. مجله علمی شیلات ایران، دوره ۶۶، شماره ۱: ۵۹-۷۰.
- عبدلی، ا.، ۱۳۷۸، ماهیان آب های داخلی ایران، انتشارات موزه حیات وحش. ۱۰۸ص.
- Abdoli A., 2000.** The inland water fishes of Iran. Tehran: Nature and Wildlife Meusume of Iran.
- Adams, D.C. and Collyer, M.L., 2009.** A general framework for the analysis of phenotypic trajectories in evolutionary studies. *Evolution*, 63, PP: 1143-1154.
- Aleev, Y.G., 1969.** Function and gross morphology in fish. 106P.
- Beacham, T.D., 1985.** Meristic and Morphometric variation in pink salmon (*Onchorhynchus gorbuscha*) in southern British Columbia and Puget Sound. *Canadian Journal of Zoology*, 63: 366-372.
- Brazner, J.C., Tanner, D.K., Detenbeck, N.E., Batterman, S.L., Stark, S.L., Jagger, L.A. and Snarski, V.M., 2005.** Regional, Watershed, and site-specific environmental influences on fish Assemblage structure and function in western Lake Superior tributaries. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 62, 1254-1270.
- Breitenstein, M.E. and Kirchhofer A., 2000.** Growth, age structure and species association of the cyprinid *Alburnoides bipunctatus* in the

رژیم غذایی جریان آب در سه منطقه، تفاوت دمای آب بین این سه منطقه نیز بر شکل و اندازه بدن جمعیت‌های زیست‌کننده در آن مناطق توانسته تأثیرگذار باشد. بر اساس مطالعات قبلی ماهیان خیاطه در زیستگاه‌های مختلف با توجه به شرایط حاکم بر آن زیستگاه از جمله وضعیت بستر، شدت جریان آب، نحوه تغذیه بر اساس غذاهای در دسترس به تفاوت‌هایی در شکل ظاهری به خصوص در قسمت قدامی بدن، دچار می‌شوند (Heino, 2002) این خصوصیت بیان می‌کند که ویژگی‌های زیستگاهی در کنار جدایی جغرافیایی از عوامل تعیین کننده تغییرات تکاملی است که منجر به تغییر ویژگی‌های ریختی ماهیان آن منطقه می‌شود. از سوی دیگر، در خصوص این مطلب که شرایط محیطی متفاوت (دما، کدورت، عمق آب و جریان آب) سبب جدایی جمعیت‌هایی که در رودخانه‌های متفاوت وجود دارند، می‌شود، این شرایط در رابطه با این مطالعه نیز صدق می‌نماید.

توضیح علل وجود تفاوت‌های ریختی میان جمعیت‌ها دشوار است. به طور کلی، ویژگی‌های ریختی تحت کنترل و در هم‌کنش دو عامل شرایط محیطی و ژنتیک می‌باشند (Fisher and Hogan, 2007). رابطه بین مورفولوژی و اکولوژی در ماهی‌ها شناخته شده و مطالعات متعددی جهت تعیین الگوهای ریخت بوم‌شناسی در گونه‌های ماهیان انجام شده است. ماهیان نسبت به تغییرات محیطی بسیار حساس بوده و به سرعت خود را با تغییرات محیطی سازگار می‌کنند و فیزیولوژی بدن خود را با تغییرات محیطی تطبیق می‌دهند (Cadrin, 2000). مطالعات بسیاری نیز سازگاری یا تمایز شکل بدن وابسته به زیستگاه را در ماهیان متفاوت نشان داده‌اند (Mamturis et al, 1998). به عنوان نتیجه‌گیری کلی، با توجه به این‌که تغییرات در مورفولوژی مستقیماً از شرایط محیطی تأثیر می‌پذیرد، می‌توان عنوان کرد که زیستگاه در مناطق مورد مطالعه دارای شکل‌های متفاوتی بوده و این تفاوت در زیستگاه، خود را در مورفولوژی صفات مختلف اندازه‌گیری شده نشان داده است.

- River Aare, Switzerland. *Folia Zoologica*, 49, pp. 59–68.
- Cadrin, S.X., 2000.** Advances in morphometric identification of fishery stocks. *Reviews In Fish Biology And Fisheries*, 10: 91–112.
- Dadikyan, M.G., 1972.** A new subspecies of the European riffle minnow *Alburnoides bipunctatus armeniensis sub sp. nov.* *Journal of Ichthyology*, 12: 519-522.
- Fisher, R. and Hogan, J.D., 2007.** Morphological predictors of swimming speed: a case study of pre-settlement juvenile coral reef fishes. *Journal of Experimental Biology*, 210: 2436–2443.
- Heino, J., 2002.** Concordance of species richness patterns among multiple freshwater taxa: a regional perspective. *Biodiversity and Conservation*, 11, 137–147.
- Kuliev, Z.M., 1988.** Morphometric and ecological characteristics of Caspian Vimba” Vimbavim bapera”. *Journal of Ichthyology*, 28: 29-37.
- Lagler, K., Bardach, J. E., Miller, R. and Passion, D.R.M., 1977.** Ichthyology. John Wiley, New York, U.S. 312P.
- Langerhans, R.B., Layman, C.A., Langerhans, A.K. and DeWitt, T.J., 2003.** Habitat-associated morphological divergence in two Neotropical fish species. *Biological Journal of Linnean Society*, 80: 689–698.
- Mamuris, Z., Apostolidis, A.P., Panagiotaki, P., Theodorou, A.J. and Triantaphyllidis, C., 1998.** Morphological variation between red mullet populations in Greece. *Journal of Fish Biology*, 52: 107-117.
- Paknejad, S., Heidari, A. and Mousavi-Sabet, H., 2014.** Morphological variation of shad fish *Alosa brashnicowi* (Teleostei, Clupeidae) populations along the southern Caspian Sea coasts, using a truss system. *International Journal of Aquatic Biology*, 2(6): 330-336.
- Pinheiro, A., Teixeira, C.M., Rego, A.L., Marques, J.F. and Cabral, H.N., 2005.** Genetic and morphological variation of *Solea lascaris* (Risso, 1810) along the Portuguese coast. *Fisheries Research*, 73: 67- 78.
- Poulet, N., Berrebi, P., Crivelli, A.J., Lek, S. and Argillier, C., 2004.** Genetic and morphometric variation in the pikeperch *Sander lucioperca* of a fragmented delta. *Archives of Hydrobiology*, 159 (4): 531-554.
- Tudela, S., 1999.** Morphological variability in a Mediterranean, genetically homogeneous population of the European anchovy, *Engraulis encrasicolus*. *Fisheries Research*, 42: 229-243.
- Turan, C., Oral zturk, B.O. and Duzgunes, E., 2006.** Morphometric and meristic variation between stocks of Bluefish, *Pomatomus saltatrix* in the Black, Marmara, Aegean and northeastern Mediterranean Seas. *Fisheries Research*, 79: 139–147.
- Tzeng, T.D., 2004.** Morphological variation between populations of spotted mackerel *Scomber australasicus* off Taiwan. *Fisheries Research*, 68: 45- 55.
- Webb, P.W., 1982.** Locomotor patterns in the evolution of actinopterygian fishes. *American Zoologist*, 22: 329–342.
- Wootton, R.J., 1990.** Ecology of teleost fishes. Chapman and Hall Ltd, London, UK. 415P.



## Study of Spiralin fish populations (*Alburnoides eichwaldii*) using morphological traits in rivers of Golestan province

Sahraei H.<sup>1\*</sup>; Pirali Zefrehei A.R.<sup>2</sup>; Azizi S.<sup>3</sup>; Houshmand P.<sup>2</sup>; Hedayati S.A.A.<sup>2</sup>

\* hasansahraei22@gmail.com

- 1- Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Agriculture, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
- 2- Department of Fisheries and Aquatic Ecology, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
- 3- Department of Marine Science and Technology, Faculty of Marine Sciences and Technology, Hormozgan University, Hormozgan, Iran

### Abstract

The aim of this study was to investigate the possibility of isolating study stocks of spiralin populations (*Alburnoides eichwaldii*) using morphometric traits in rivers of Golestan province, between three regions of Zarrin Gol, Mobarakabad and Dasht in spring 2016. For this purpose, first 45 samples of tailoring fish were caught, then Morphological traits were measured using a caliper with an accuracy of 0.01 mm. In morphological traits, the possibility of separating the two reserves was studied from the principal component analysis method. The present study showed that the samples were separated in three areas, which could be due to habitat conditions and bed material. In general, similar studies for rational and efficient management of fisheries and protection of biological resources and genetic resources, identification of storage structure a species of fish native to each region is recommended.

**Keywords:** Population segregation, Morphology, Mobarakabad, Zarrin Gol, Habitat