

بهبود رنگ در ماهیان زیستی با غذای زنده ریز جلبک

محمود حافظیه^۱، اسد عباس پورانبی^{*۲}، مسعود صید گر^۳، علی نکویی فرد^۴

* Asadanbi1208@gmail.com

- ۱- موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 ۲- مرکز تحقیقات آرتمیا کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

تاریخ پذیرش: آذر ۱۳۹۸

تاریخ دریافت: مرداد ۱۳۹۸

چکیده

در طبیعت، ماهیان زیستی دارای رنگ‌های بسیار زیبا و متنوعی هستند که در شرایط پرورش متراکم در سالن‌های تکثیر و پرورش دچار کم‌رنگی یا پریدگی رنگ می‌شوند. تغذیه این ماهیان با جلبک‌ها می‌تواند رنگ آن‌ها را بهبود بخشد. بدین منظور از غذای مرحله لاروی قزل‌آلای رنگین کمان به عنوان غذای پایه استفاده شد. غذاهای تیماری که از پودر کردن غذای پایه به دست آمد، با درصدهای مختلف جلبک‌ها آغشته شد که به دلیل چربی بالای غذا این آغشتگی به نحو احسن انجام گردید. سپس با آب جوش نیمه سرد شده بشکل خمیر در آمده و از دستگاه پلتزن عبور و با کرامپلر خرد شدند تا به اندازه مورد نیاز دهان ماهیان زیستی برسند. در این مطالعه با تغذیه ریز جلبک غنی از کاروتینوئید اسپیروولینا پلتتسیس^۱ و یک درصد هماتوکوکوس پلوویالیس^۲ در طی ۳ هفته به میزان ۱/۵ تا ۲ درصد، رنگ بدن شمشیر ماهی^۳، قزل‌آلای زیستی^۴ و سیچلاید ایرانی^۵ به طور معنی‌داری بهبود یافت.

کلمات کلیدی: ماهیان زیستی، تغییر رنگ، غذای زنده، ریز جلبک

^۱- *Spirulina platensis*

^۲- *Haematococcus pluvialis*

^۳- *Xiphophorus hegelii*

^۴- *Pseudomugil furcatus*

^۵- *Iranochichla hormozensis*

مقدمه

این دو ریز جلبک در جیره غذایی ماهیان زینتی موضوع این مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

تعداد ۱۰ عدد از هر یک از ماهیان زینتی شامل شمشیر ماهی، قزلآلای زینتی و سیچالاید ایرانی با متوسط وزن $3/5 \pm 0/5$ گرم از یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در رباط کریم تهران خریداری گردید. این ماهیان ابتدا به مدت یک هفته با غذای پایه-غذای مرحله بچه ماهی قزلآلای رنگین کمان تولیدی کارخانه ۲۱ بیضا استان فارس با ۴۴ درصد پروتئین و چربی ۱۳ درصد فاقد هر گونه رنگدانه تغذیه سازشی شدند. سپس بخشی از غذا با آسیاب پودر و با درصدهای بین $0/05$ تا $0/05$ درصد ریز جلبک‌های اسپیروولینا پلاتنسیس و هماتوکوس پلوویالیس در وزن خشک غذا به ترتیب صفر (غذای کنترل)، $0/05$ ، $0/01$ ، $0/02$ درصد افزوده، مجدداً با آب جوش نیمه سرد شده مخلوط تا بشکل خمیری درآمده در دستگاه پلت زن با روزنه ۱ میلیمتر به شکل رشته‌ای در آمده بعد از خشک کردن با کرامپلر به اندازه دهان ماهیان زینتی خرد شدند (Ako et al., 1997; Ako, 1997؛ 2015) و طی پنج سطح آزمایشی در آکواریوم‌های ۱۰۰ لیتری با ۸۰ لیتر آبگیری با کلیه تجهیزات گرمادهی، هوادهی و فیلتراسیون در شرایط کاملاً مساوی به مدت ۳ هفته روزانه سه بار در حد سیری تغذیه شدند. وجود چربی زیاد در غذا باعث گردید تا چسبندگی ریز جلبک‌ها به غذا به بهترین شکل ممکن انجام گیرد (Ako et al., 2015).

با توجه به سه ماهی زینتی و دو ریز جلبک در سطوح مختلف ۵ گانه غذایی، طرح آزمایشی شامل سه گروه کنترل و ۳۰ تیمار جمعاً ۳۳ گروه آزمایشی هر یک به سه تکرار و با توجه به متغیر کمی شده شدت رنگ بدن با بهره‌گیری از دستگاه طیفسنجی (رنگ‌سنجی) آزمایشگاه رنگ‌سنجی دکتر طبیعی تهران در قالب One-Way ANOVA و با بهره‌گیری از تست دانکن در سطح ۹۵٪ انجام گردید. در این رنگ‌سنجی طیف رنگ‌ها از ۱ تا ۴ کمی شده است (منظور از عدد ۱ کمترین شدت رنگ و ۴ بیشترین شدت رنگ می‌باشد).

ماهیان زینتی در اکوسیستم‌های طبیعی خود رنگ‌های شفاف، پررنگ با درخشندگی خاصی دارند که در شرایط پرورشی گاه کدر، کم رنگ و فاقد درخشندگی می‌شوند. این موضوع از چشم خریداران این ماهیان دور نمی‌ماند و به طور طبیعی مشتریان این محصولات زینتی به دنبال ماهیانی هستند که خصیصه رنگ در آن‌ها از جذابیت بیشتر و بهتری برخوردار است. این موضوع به خصوص در مورد پرورش ماهیان زینتی Ako et al., 2015). کاهش کیفیت رنگ با کاهش فروش یا قیمت همراه است و اقتصاد این صنعت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل تحقیق در مورد رنگ در ماهیان زینتی بسیار مورد استقبال پژوهشگران حوزه اقتصاد تولید قرار دارد. یکی از راههای ایجاد رنگ‌های پایدار مشابه آنچه در طبیعت رخ می‌دهد، بهره‌گیری از غذاهای زنده بهویژه ریز جلبک‌ها به عنوان غذاهای اولیه این ماهیان در اکوسیستم‌های زینتی به اسامی شمشیر ماهی، قزلآلای زینتی و محمل ماهی با درصدهای مختلف بین $0/05$ تا $0/5$ درصد ریز جلبک‌های کاروتونوئیدار اسپیروولینا^۱ و هماتوکوس^۲، اضافه شده به غذای پایه قزلآلای رنگین کمان تغذیه شدند و شدت رنگ^۳ در آن‌ها مورد مقایسه قرار گرفت (Ako and Tamaru, 1999). دلک ماهی را دو هفتۀ تحت تاثیر غذای ریز جلبکی گونه‌ای از جنس هماتوکوس قرار دادند و تأثیر ریز جلبک‌ها را بر تعییر شدت رنگ این ماهی بواسطه آستاگزانتین آن، ثابت کردند. در آکواریوم پارک حیات وحش هاوایی-آمریکا، گونه‌های ماهیان زینتی تحت آزمایش تغذیه‌ای با 25 میلی‌گرم آستاگزانتین در هر کیلوگرم غذا، پاسخ‌های مشابهی را در شدت رنگ، شفافیت و درخشندگی رنگ بدن ماهیان بروز دادند. با این وجود بین آستاگزانتین مصنوعی و طبیعی اختلاف معنی‌دار بود (Ako and Tamaru, 1999) که دو ریز جلبک اسپیروولینا پلاتنسیس و هماتوکوس پلوویالیس غنی از آستاگزانتین طبیعی هستند، بهره‌گیری از

¹ - *S. platensis*

² - *H. pluviale*

³ - Intensely color

نتایج

۴) تفاوت معنی داری با هم ندارند و فقط نسبت به گروه کنترل اختلاف آماری نشان می دهند ولی از آنجا که افزودن ۰/۴ درصد ریز جلبک به غذا هزینه های بیشتری را به پرورش دهنده گان ماهیان زینتی اعمال می کند، سطوح ۰/۱۵ و ۰/۲ درصد به عنوان بهترین سطح افزودن ریز جلبک های فوق به جیره غذایی این ماهیان آزمایشی توصیه می شود.

اندازه گیری متغیر شدت رنگ در سه ماهی زینتی شمشیر ماهی، قزل آلای زینتی و محمول ماهی تغذیه شده با سطوح مختلف ۰/۰۵ تا ۰/۴ درصد از دو ریز جلبک اسپیروولینا پلاتنسیس و هماتوکوکوس پلوویالیس افزوده شده به غذای پایه مرحله بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با متوسط سه تکرار در جدول ۱ آمده است.

همانطور که در جدول ۱ مشاهده می شود، گرچه تیمارهای ۰/۱۵، ۰/۲ و ۰/۴ از نظر ایجاد شدت رنگ (کمیت

جدول ۱: متوسط سه تکرار گروه های مختلف تیماری بر شدت رنگ سه ماهی زینتی (اعداد از ۱ تا ۴ ردیف شده اند که ۱ کمترین و ۴ بیشترین شدت رنگ را داشته است).

تیمارهای غذایی	شمشیر ماهی	قزل آلای زینتی	محمول ماهی
کنترل	۱	۱	۱
هماتوکوکوس	۲	۲	۲
اسپیروولینا	۲	۲	۲
هماتوکوکوس	۳	۳	۳
اسپیروولینا	۳	۳	۳
هماتوکوکوس	۴	۴	۴
اسپیروولینا	۴	۴	۴
هماتوکوکوس	۴	۴	۴
اسپیروولینا	۴	۴	۴
هماتوکوکوس	۴	۴	۴
اسپیروولینا	۴	۴	۴

اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد می باشد (a) از نظر شدت رنگ نشان دهنده بهترین به ترتیب حروف بعدی رتبه های پایین تر را نشان می دهند).

در جدول زیر متوسط امتیاز (Score 1-4) ماهیان در گروه های تیماری جدول بالا که بر اساس درصد افزودن ریز جلبک در جدول اختصار شده و گروه کنترل از نظر آماری مقایسه شده اند و با حروف الفبای غیر مشابه در هر ردیف نشانه

جدول ۲: اختلافات آماری بین ماهیان زینتی در تغذیه از گروه های تیماری

ماهی	تعداد در هر آکاریوم	امتیاز
شمشیر ماهی	۱۰	۰/۰۵ هماتو- اسپیرو
ماهی قزل آلای زینتی	۱۰	۰/۱۵ هماتو- اسپیرو
محمل ماهی	۱۰	۰/۲ هماتو- اسپیرو

هماتو = هماتوکوکوس پلوویالیس

اسپیرو = اسپیروولینا پلاتنسیس

بحث

در گروه ماهیانی که از تیمار غذایی ۰/۰۵ درصد ریزجلبک‌ها در غذایشان استفاده نموده‌اند، قبل از اینکه مقدار رنگدانه بتواند زیر پوست ذخیره شود طی متابولیسم هضم و جذب شده ولی در مقادیر بالاتر این رنگدانه، ۰/۱۵، ۰/۲ و ۰/۴ درصد، بخش قابل هضم مصرف و اضافی آن زیر پوست ذخیره شده است.

نتیجه ترویجی

به مزرعه‌داران ماهیان زینتی توصیه می‌شود ضمن توجه جدی به رنگ ماهیان پرورشی که می‌تواند استقبال بیشتر مشتریان را به همراه داشته و سود اقتصادی بیشتری نصیب آن صنعت نماید، از درصدهای بین ۲ تا ۳ درصد ریزجلبک‌ها به خصوص گروههایی که از نظر رنگدانه‌ای غنی هستند (اسپیرولینا و هماتوکوکوس) در غذای این ماهیان اضافه نمایند. برای این منظور کافی است غذا با چربی بالا را انتخاب، آن را پودر کنند و با آب جوشیده نیمه سرد شده آنقدر مخلوط کنند که محصول حاصل کاملاً خمیر نشده بلکه با دست براحتی شکل گیرد. سپس می‌توانند آن را از چرخ گوشت یا پلت زن صنعتی با چشم‌های کوچک (۱ میلیمتر) عبور داده رشته‌های به دست آمده را در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت کاملاً خشک و با دستگاه خردکن در حد اندازه دهان ماهیان موردن پرورش درآورده غذا را در شرایط خنک نگهداری و مصرف نمایند.

منابع

- علیشاھی، م.، کریمی‌فر، م.، مصباح، م. و زارعی، م.، ۱۳۹۳. مقایسه اثر آستاگرانتین و جلبک دونالیلا سالینا (*Dunaliella salina*) بر میزان کاروتونوئید پوست، پراکسیداسیون لیپیدها و رنگ ماهی سوروم (*Heros serverus*). مجله تحقیقات دامپزشکی، ۱۰۲(۱): ۹۵.
- حافظه، م.، صیدگر، م.، قائدی، ع.ر. و محمدی طبسی، م.، ۱۳۹۷. استفاده از پودر آزولای (*Azolla filiculoides*) تلال انزلی به عنوان منبع پروتئین گیاهی در تغذیه ماهی زینتی سیچلاید

در مقایسه با ماهیان پرورشی، وجود رنگدانه‌های پوستی از صفات ویژه مهم و اقتصادی در ماهیان زینتی است و استفاده از مکمل‌های جیره غذایی حاوی کاروتونوئیدها به‌منظور بهبود رنگدانه‌های پوستی آن‌ها و ایجاد جانوران زیباتر توصیه می‌گردد (علیشاھی و همکاران، ۱۳۹۳؛ al., 2015). چون ماهی‌ها، مانند سایر حیوانات، قادر به بیوسنتر کاروتونوئیدها نیستند ولی می‌توانند کاروتونوئیدهای غذایی را تعدیل کرده و در پوست و سایر بافت‌های خود ذخیره کنند، لذا باید آن‌ها را از منابع جیره غذایشان دریافت کنند (Yanar and Tekelioglu, 1999). منابع گیاهی مانند اسپیرولینا به عنوان منبع رنگدانه کاروتونوئیدی برای قزل‌آلای رنگین کمان و کپورفانتزی (Choubert, 1979؛ Boonyarapatin and Pherom Kunthony, 1986) و خوارک گلبرک گل همیشه بهار برای بارب ببری (Boonyarapatin and Lovell, 1977) استفاده شده است. در آزمایش فوق، کاملاً مشخص است که گروه‌های تیماری نسبت به گروه غذایی کنترل فاقد ریزجلبک‌ها، شدت رنگ بهتر و بیشتری در ماهیان زینتی تغذیه کننده به وجود می‌آورند. استفاده از ریزجلبک‌های طبیعی امکان جذب رنگدانه‌های کاروتونوئیدی را در این ماهیان افزایش داده (مشابه آنچه در طبیعت رخ می‌دهد) و به افزایش شدت رنگ بدن این ماهیان منجر شده است. لذا وجود ترکیبات رنگدانه‌ای طبیعی می‌تواند حتی نسبت به هورمون‌ها و ترکیبات شیمیایی نیز ارجحیت رنگ‌پذیری در بدن ماهیان زینتی را داشته باشد (AKo et al., 1955). ماهیان زینتی تحت تأثیر بتاکاروتون و آستاگرانتین موجود در ریزجلبک‌ها، به ترتیب رنگ آبی-سیز و رنگ قرمز بیشتری کسب می‌کنند. حافظه و همکاران (۱۳۹۷) تأثیر آزولا تلال انزلی را بر ماهی زینتی سیچلاید ایرانی بررسی و تغییر رنگ را در این ماهی به‌واسطه وجود رنگدانه در این گیاه آبزی نسبت به گروه شاهد معنی دار اعلام نمود. البته در برخی آزمایشات مشخص شده است که ماهیانی که از رنگدانه در ترکیب غذایی استفاده نموده اند قبل از اینکه رنگدانه بتواند به خوبی در بافت پوست جایگزین و ذخیره شوند، توسط فعالیت‌های متابولیکی ماهی تجزیه شده و لذا تغذیه از این رنگدانه‌ها چندان تأثیری در شدت رنگ ایجاد شده بدنی آن‌ها نداشته است (Katsuyama and Matsuno, 2018).

- carotenoids, Carotene, canthaxanthin, astaxanthin, zeaxanthin, lutein, and tunaxanthin in tilapia *Tilapia nilotica*. Comp. Biochem. Physiol, 90B: 131-139.
- Miki, W., Yamaguchi, K., Konosu, S., Takane, T., Satake, M., Fujita, T., Kuwabara, H., Shimeno, S. and Takeda, M., 1985.** Origin of tunaxanthin in the integument of yellowtail (*Seriola quinqueradiata*). Comp. Biochem. Physiol. 80B: 195-201.
- Sornsupharb, B., Lomthaisong, K. and Dahms, H.U., 2015.** Effects of dried fairy shrimp *Streptocephalus sirindhornae* meal on pigmentation and carotenoid deposition in flowerhorn cichlid, *Amphilophus citrinellus* (Gunther, 1864) × *Cichlasoma trimaculatum* (Gunther, 1867). Aquaculture Research, 46: 173-184.
- Tamaru, C.S. and Ako, H., 1997.** Growth of the angelfish *Pterophyllum scalare* using various Commercial feeds. I'a O Hawai'i, 4: 1-8.
- Yanar, M. and Tekelioglu, N., 1999.** Dogal ve sentetik karotenoyitlerin japon balıklarının (*Cyprinus auratus*) pigmentasyonu uterine etkisi. Tubitak. Tr.J. of Veterinary and Animal Sciences, 3: 501- 505.
- ایرانی (Iranocichla hormuzensis) فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. پذیرش چاپ.
- Ako, H. and Tamaru, C.S., 1999.** Are feeds for food fish practical for aquarium fish? International Aquafeed, 2: 30-36.
- Ako, H., Tamaru, C.S., Asano, L., Yen, B. and Yamamoto, M., 1955.** Achieving natural coloration in fish under culture. Journal of Ornamental fish, University of Hawaii. Molecular Biosciences and Biosystems Engineering College of Tropical Agriculture and Human Resources 1955 East-West Road, Room 511, Honolulu, HI 96822 USA. UJNR Technical Report No. 28. 4p.
- Boonyaratpatin, M. and Pherom Kunthony, W., 1986.** Effects of carotenoid pigments from different sources on color changes of fancy carp (*Cyprinus carpio*) Linn. Jour. Sci. Technol, 8(1): 11-20.
- Boonyaratpatin, M. and Lovell, R.T., 1997.** Diet preparation for aquarium fish. Aquac, 12: 53- 62.
- Choubert, G., 1979.** Tentative utilization of spirulina algae as a source of carotenoid pigments for rainbow trout. Aquac, 18: 135- 143.
- Katsuyama, M. and Matsuno, T., 1988.** Carotenoid and vitamin A*, and metabolism of

Improvement of ornamental fish color with live algae feeding

Hafeziyeh M.¹; Abbaspour Anbi A.^{2*}; Seidgar M.²; Nekoeifard A.²

* Asadanbi1208@gmail.com

1-Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran

2-National Artemia Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Urmia, Iran.

Abstract

In the nature, ornamental fish have a variety of beautiful colors that becomes pale or dull colored in conditions of intensive culture in breeding halls. Feeding these fish with algae can improve their color. For this purpose, rainbow trout larval stage feed was used as the base feed. The treated foods obtained from the powdering of the basic food were impregnated with different percentages of algae, which because of the high fat content of the food, this impregnation was done efficiently. They were then boiled in semi-cooled boiling water and passed through the pelletizer and crushed with crampers to reach the ornamental fish's mouth .In this study, feeding on carotenoid-rich microalgae *Spirulina platensis* and 1% of *Hematococcus pluvialis* significantly improved body color of swordfish, ornamental trout and Cichlid in 1.5 to 2% for 3 weeks.

Keywords: Ornamental fish, Discoloration, Live food, Algae